

ត្រីតួបត្រសុខភាព មន្ទីរពេទ្យ កាល់ម៉ែត

Calmette's Newsletter N° 05

ខែ មករា ២០១៨ - មីនា ២០១៨

ត្រីតួបត្រលេខ ៥



រៀបចំដោយ

គណៈកម្មការទស្សនាវដ្តីនៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត



ដំណើរផ្សេងៗ

ខែ មករា ២០១៨ - មីនា ២០១៨ ទស្សនាវដ្តីលេខ ៥

“ស្រ្តីមធ្យមក្សានុភាព ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ”

៨ មីនា

តើជំងឺដុំមហារីកបំពង់អាហារ
អាចមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

ជំងឺលើសឈាម
ឬជំងឺលើសសម្ពាធឈាម!

ជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល
អាចបង្ការបាន!

01

ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាថ្កើងការដ្ឋានសាងសង់
“អគារបង្ហាញបញ្ជីបញ្ជីកម្រិត”
នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនៃកម្ពុជា!

02

បងប្អូនស្រ្តីព្រួយបារម្ភណ៍
ពីគីសដៃស្បូន !

03

04

អាហ្វេរីស៊ីស
(Apheresis)!

05

06

ទើបតែបាន ៤,៣ គីឡូក្រាម
រីកាត់បេះដូង!

07

08

សំណួរចម្លើយ Quiz
ទាក់ទងនឹងសុខភាព

09



ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់

“អគារមជ្ឈមណ្ឌលពហុឯកទេស”

នៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនៃកម្ពុជា!

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសេវាសុខាភិបាលដែលបន្តកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំ ទៅមួយឆ្នាំ ដែលបង្ហាញតាមរយៈសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៃ មន្ទីរពេទ្យ ទាំងផ្នែកពិគ្រោះជំងឺក្រៅ ផ្នែកសម្រាកពេទ្យគ្រប់ឯកទេសនិងជំនាញ ការពិនិត្យនៅមន្ទីរពិសោធន៍ និងផ្នែករូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រ គម្រោង សាងសង់អគារពហុ ឯកទេស បានលេចជារូបរាងឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដ នាថ្ងៃច័ន្ទ ៤រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦១ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ជាមួយ ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់ “អគារមជ្ឈមណ្ឌលពហុឯកទេស” ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សាស្ត្រាចារ្យ ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង សុខាភិបាល ដែលនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ នៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត។

អគារទំនើបថ្មីមួយបន្ថែមទៀតនេះ នឹងបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យាវេជ្ជសាស្ត្រឈានមុខ ដែលប្រមូលផ្តុំទៅដោយឯកទេសវេជ្ជសាស្ត្រ និងសល្យ សាស្ត្រសំខាន់ៗ ទាំងអស់រួមទាំង ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ ផ្នែកប្រពោធនកម្មពហុឯកទេសទំនើប។



ការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលពហុឯកទេសដែលនឹងផ្តល់ជូនសេវាសុខភាពគ្រប់ជំនាញ ត្រូវបានកំណត់មួយផ្នែក ដោយការកើនឡើងយ៉ាងលឿនរបស់ នៃអត្រា ប្រើប្រាស់គ្រែ (១២៨% នៅឆ្នាំ២០១៧) និងមួយផ្នែកទៀត ដោយស្ថានភាពជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ និងស្មុគស្មាញ ជាពិសេសក្នុង គោលដៅ សម្រាប់ដោះស្រាយ គ្រប់បញ្ហាសុខភាព ប្រឈមចុងក្រោយ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ អគារមជ្ឈមណ្ឌលពហុឯកទេសនេះក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល ធនធានមនុស្ស កម្រិតឯកទេស និងស្រាវជ្រាវ ដែលជាត្រីវិស័យ ដើម្បីវិភាគ និងកំណត់គោលនយោបាយវិស័យមន្ទីរពេទ្យ សម្រាប់អនាគតកាន់តែ ប្រសើរជាលំដាប់។


ជំហានថ្មីបន្ទាប់ដើម្បីសម្រេចបាននូវអគារពហុឯកទេស ដែលមាន ទំហំ ៣២៨គ្រែ រួមទាំងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រទំនើប គឺជាផ្នែកដែលបាន អំពីការជំរុញ យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ដោយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខា ភិបាល និងទទួលបានការឯកភាពគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងប្រកបដោយ ការលើកទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតពី សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។



“ផ្លូវបញ្ជូនក្បាសន្តិភាព ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ” ៨ មីនា

ព្រឹកថ្ងៃពុធ ៦ រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត បានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរ ទិវាអន្តរជាតិនារី ៨ មីនា ក្រោមប្រធានបទ “ផ្លូវបញ្ជូនក្បាសន្តិភាព ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ” ។

ការប្រារព្ធទិវានេះ ក្នុងគោលបំណងរំលឹកដល់ការតស៊ូរបស់នារីនៅទូទាំងសកលលោក ក្នុងការទាមទារឱ្យមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិ ស្ថានភាព ជីវភាព ឋានៈ តួនាទីរបស់ស្ត្រី មានការលើកឡើងនូវប្រធានបទដែលមានខ្លឹមសារស្របទៅនឹងបរិបទរបស់ប្រទេស ដែលជំរុញឱ្យមានការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុង គ្រប់វិស័យ ដើម្បីស្ត្រីបានចូលរួមចំណែកថែរក្សា ការពារសន្តិភាព សន្តិសុខ សុវត្ថិភាពសង្គម សេចក្តីសុខចម្រើន និងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមគ្រួសារ សហគមន៍ និងសង្គមជាតិ។



“មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតសូមគោរពជូនពរស្រ្តីក្របីរូប សូមមានសុខភាពល្អ និងប្រាជ្ញាស្មារតីបរិបូរណ៍ដើម្បី ចូលរួមបំណែកក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមគ្រួសារ ស្ថាប័ន និង សង្គមជាតិ។”





តើជំងឺដុំមហារីកបំពង់អាហារ អាចមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

ជំងឺមហារីកបំពង់អាហារ គឺជាការវិវត្តមិនប្រក្រតី (លឿនខុសធម្មតា) នៃកោសិកា របស់បំពង់អាហារ បង្កើតបានជាដុំសាច់ ដែលយើងតែងតែហៅថាជំងឺដុំសាច់ មហារីក (cancer) នៃបំពង់អាហារ។ ជំងឺនេះត្រូវបានចែកជាពីរប្រភេទធំៗគឺ ពួកស្កេមមេសែសែល ការស៊ីណូម៉ា (squamous cell carcinoma) និងអាដេណូ កាស៊ីណូម៉ា (adenocarcinoma) ។

ក) តើចំណុចមហារីកបំពង់អាហារ អាចមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

យើងតែងតែសង្កេតឃើញថា អ្នកជំងឺដែលមានដុំមហារីកបំពង់អាហារនេះ គឺមាន រោគសញ្ញាដូចជា៖

- អួលពណែន និងពិបាកលេបអាហារចូល (ដំបូង អាហាររឹង បន្ទាប់មករាវ និងចុងក្រោយទឹកក៏ពិបាកលេបដែរ) ។
- ឈឺចុកចាប់ នៅពេលបរិភោគអាហារ
- កូតចង្កោរ បន្ទាប់ពីបរិភោគអាហាររួច
- មានការចុកពណែនអួល ក្នុងដើមទ្រូង
- មានការស្លេកស្លាំង និងខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហម
- ចុះខ្សោយ អស់កម្លាំង កំហែង និងព្យាបាល
- មិនចង់ទទួលទានអាហារ និងផុសសាច់
- ស្រកទម្ងន់ខ្លាំងខុសពីធម្មតា
- ពេលខ្លះវាក៏អាចបណ្តាលឲ្យមានការហូរធ្លាក់ឈាមផងដែរ។ល។

ខ) តើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលអាចបណ្តាលឱ្យកើតមានឡើងនៃដុំមហារីកនេះ?

កត្តាប្រឈមដែលអាចបង្កឲ្យមានដុំមហារីកនេះកើតមានបានដូចជា៖

- ការពិសាបារី រយៈពេលវែង
- ពិសាសុរាច្រើនហួសកម្រិត
- ជំងឺប្រាសាតិកាស៊ីតរបស់ក្រពះ និងរលាកបំពង់អាហាររ៉ាំរ៉ៃដោយមិនបាន ព្យាបាលត្រឹមត្រូវតាមកូរនេច្បាប់វេជ្ជសាស្ត្រ (GERD) ។
- អាយុច្រើន (លើសពី ៥៥ ឆ្នាំ)
- ភេទ ប្រុស
- ការទទួលទានចំណីអាហារមិនសមស្រប។ល។

គ) ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ៖ វិធីតែមួយគត់ដែលច្បាស់លាស់ ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺ មហារីកបំពង់អាហារនេះបាននោះគឺ ការចតឆ្លុះក្រពះ ព្រមទាំងធ្វើការយកសាច់ ទៅវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៍ (Gastric Fibroscopy and Anapath) ។ បន្ទាប់ពី នោះក៏ត្រូវមានផងដែរគឺ ការចតស្ថាន មើលដើមទ្រូង និងផ្ទៃពោះ (Thoraco-abdominal CT-SCAN with injection) ដើម្បីកំណត់បាននៅដំណាក់កាល និង ការវិវត្តន៍របស់ជំងឺ ហើយក៏ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យ កំណត់ទៅលើការ ព្យាបាលផងដែរ។

ឃ) ការព្យាបាល៖ ការព្យាបាលជំងឺដុំមហារីកបំពង់អាហារនេះ គឺត្រូវទាមទារឲ្យ មានការចូលរួម ពីសំណាក់ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតច្រើនមុខនាពេល ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សា

វិវេកវិធីមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកជំងឺ ទើបការព្យាបាលអាចមានប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់ និងចំគោលដៅ ក្នុងនោះមាន៖

- ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែក ថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន
- ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់
- ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែក ជំងឺមហារីក
- និងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែករូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ។
- សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតក្រុមគ្រូសារអ្នកជំងឺនិងអ្នកជំងឺផ្ទាល់ក៏ត្រូវចូលរួម ក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តផងដែរ ។ ជម្រើសជាច្រើននិងត្រូវបានលើកឡើង ផលប្រយោជន៍ និង ផលវិបាក នៃជម្រើសនីមួយៗត្រូវបានពន្យល់និងធ្វើការ ពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំងឺ និង ក្រុមគ្រោះសារ ។ ការសម្រេចត្រូវតែមានការព្រមព្រៀង ពី អ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រូសារ។

ទោះជាយ៉ាងណា ប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលជំងឺមហារីកបំពង់អាហារគឺមាន កម្រិត ដោយភាគច្រើននៃអ្នកជំងឺមកជួបពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យគឺមានសភាព ធ្ងន់ធ្ងរ ដែលជាហេតុនៃការយឺតយ៉ាវក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ (អ្នកជំងឺមកជួបគ្រូពេទ្យ យឺតពេល) ។ ការព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺត្រូវធ្វើនូវដំណាក់កាល ដំបូង ដែលអ្នកជំងឺមិនទាន់មានលេចចេញជា រោគសញ្ញា ។ ការឆ្លុះក្រពះគឺជា វិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលអាចឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន ។ សូមជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញនៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និង ព្យាបាលជំងឺនេះឲ្យទាន់ពេលវេលា!

រោគសញ្ញានៃជំងឺ មហារីកបំពង់អាហារ

- ពិបាកលេបចុងខ្លួន
- ពិបាកលេប / រួញ
- អស់ពិបាកលេប បានធូ
- ស្រកទម្ងន់

កត្តាប្រឈម

- ម្ហូបអាហារក្តៅ
- កង្វះអាហារដែល បានជាពិសារីង
- ពិសាបារីរ៉ាំរ៉ៃ
- ការប្រាសាតិកាស៊ីត ក្រពះ

ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ

- ថត X-Ray
- ថតឆ្លុះក្រពះ



ជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល អាចបង្ការបាន!



ជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល (Stroke) គឺជាមូលហេតុចម្បងទីមួយនៃពិការភាព នៅទូទាំងសកលលោក ជាពិសេសលើមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី ៦៥ឆ្នាំឡើងទៅ។ ក្នុងរវាងកន្លះសតវត្សចុងក្រោយនេះ អត្រានៃជំងឺនេះមានការថយចុះប្រហែល 40ភាគរយនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ តែមានការកើនឡើង ១០០ភាគរយ នៅបណ្តាប្រទេស ដែលមានចំនួនទាប និងមធ្យម។

ដោយសារតែជំងឺនេះ ភាគច្រើន អាចមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ បណ្តាលឲ្យស្លាប់ ឬក៏បន្ទុយនូវភាពពិការច្រើន ទោះបី បច្ចុប្បន្ននេះមានការព្យាបាលដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗក៏ដោយ ទើបមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើន ដើម្បីស្វែងរកវិធីបង្ការកុំឲ្យកើតមានជំងឺនេះ។

កត្តាដែលអាចបង្ការជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល ដែលយើងគ្រប់គ្នាអាចអនុវត្តបានគឺ ការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់មួយចំនួនក្នុងជីវិតរស់ នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង (Lifestyle change)។

ក) របបអាហារដែលយើងទទួលបានទានរាល់ថ្ងៃ៖

- ត្រូវពិសារអាហារដែលមានជាតិអំបិលតិចបំផុត
- ពិសារបន្លែ និងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនមុខ
- ត្រូវបញ្ចូលគ្រាប់ធញ្ញជាតិទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកាត់បន្ថយជំងឺ Stroke នេះ ដោយការទទួលបានអាហារសុខភាព(Healthy diet) អាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនេះបានដោយតាមរយៈ ការការពារជំងឺមួយចំនួនដូចជា៖

- ជំងឺលើសឈាម
- ជំងឺទឹកនោមផ្អែម
- លើសជាតិខ្លាញ់
- ជំងឺធាត់
- និងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជាដើម។ល។



ខ) តើត្រូវធ្វើលំហាត់ប្រាណបែបណា ទើបគ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវ?

ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ គឺអាចកាត់បន្ថយជំងឺលើសឈាម និងមូលហេតុបង្កផ្សេងៗទៀត នៃជំងឺសរសៃឈាម។ យើងត្រូវធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានយ៉ាងតិច ៣ ទៅ ៤ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ និងម្តងៗមានរយៈពេលយ៉ាងតិច ៣០នាទី។



គ) កត្តាផ្សេងៗទៀត ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មានដូចជា៖

- ត្រូវរក្សាលំនឹងទម្ងន់ឲ្យបានសមស្រប
 - បុរស៖ រង្វង់ចង្កេះកុំឲ្យលើសពី ៩០ សង់ទីម៉ែត
 - នារី៖ រង្វង់ចង្កេះកុំឲ្យលើសពី ៨០ សង់ទីម៉ែត
 - BMI: សូមឲ្យតិចជាង ២៣គឺឡើយក្នុងមួយម៉ែតការ៉េ (< 23 Kg/m2)
- ត្រូវអញ្ជើញពិនិត្យ និងព្យាបាល ជំងឺលើសឈាម ជំងឺទឹកនោមផ្អែម លើសជាតិខ្លាញ់ និងជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

សរុបសេចក្តីមក ដើម្បីជៀសវាងពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះ យើងទាំងអស់គ្នា គប្បីថែរក្សាសុខភាពយើងឲ្យបានល្អ និងត្រូវធ្វើការពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ជាមួយនិងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញនៃមន្ទីរពេទ្យកាល់មែត។

“សូមចូលរួមទាំងអស់ ដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលពីគ្រោះពិការភាព នាំឲ្យខាតបង់ជំរេងណាស់ ចំពោះជីវិតយើង គ្រួសារយើង និងសង្គមជាតិយើង។”

ជំងឺលើសឈាម ឬជំងឺលើសសម្ពាធឈាម!

ជំងឺលើសឈាម ឬជំងឺលើសសម្ពាធឈាម គឺជា ការកើនឡើងនៃសម្ពាធឈាមលើសពី កម្រិតធម្មតា (ដឹងបានតាមរយៈម៉ាស៊ីនវាស់សម្ពាធឈាម) ដែលវាអាចផ្តល់ផលប៉ះពាល់ទៅលើជញ្ជាំងសរសៃឈាមនៃសរីរាង្គផ្សេងៗ ជាពិសេសសរសៃឈាមបេះដូង និងសរសៃឈាមខួរក្បាល។ ជំងឺលើសឈាមត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាហេតុការណ៍សំខាន់ ដែលអាចសម្លាប់យើងបានគ្រប់ពេលវេលា។

ក) រោគសញ្ញា៖

ជាទូទៅ មនុស្សភាគច្រើនដែលកើត ជំងឺលើសឈាមមិនមានស្តែងចេញជាភាគសញ្ញាផ្សេងៗទេ បើទោះបីជាសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ដល់ កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតក៏ដោយ។ ការដែលមិនមានរោគសញ្ញានេះ ទើបធ្វើឲ្យគេហៅជំងឺលើសឈាមថា ហេតុការណ៍សំខាន់។ ក៏ប៉ុន្តែ មានអ្នកជំងឺលើសឈាមមួយចំនួនតូចអាចមានរោគសញ្ញាដូចជា៖

- ឈឺក្បាល
- រោយកញ្ជឹងក
- វិលមុខ
- ស្រវាំងភ្នែក
- ឈាមច្រមុះ ជាដើម។

ចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតសម្ពាធឈាម៖

- សម្ពាធឈាមធម្មតា សម្ពាធអតិបរមាតិចជាង 120 mmHg និងសម្ពាធអប្បបរមាតិចជាង 80 mmHg
- សម្ពាធឈាមមុនលើសឈាម សម្ពាធអតិបរមា120-139 mmHg និងសម្ពាធអប្បបរមា 80-89mmHg
- លើសសម្ពាធឈាមដំនាក់កាលទី១ សម្ពាធអតិបរមា140-159 mmHg និងសម្ពាធអប្បបរមា90-99mmHg
- លើសសម្ពាធឈាមដំនាក់កាលទី២ សម្ពាធអតិបរមាធំជាងឬលើស160 mmHg និង សម្ពាធអប្បបរមាធំជាងឬលើស100 mmHg

ខ) មូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺលើសឈាម៖

តាមការសិក្សាបានបញ្ជាក់ ៩០-៩៥% នៃជំងឺលើសឈាម គឺមិនមាន មូលហេតុពិតប្រាកដឡើយ។ ចំណែក ១០-១៥% នៃជំងឺលើសឈាមអាចមាន មូលហេតុច្បាស់លាស់ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

- ជំងឺតម្រងនោម (Kidney problems)
- ជំងឺក្រពេញក (Thyroid problems)
- ជំងឺក្រពេញលើក្រពេញតំរងនោម (Adrenal gland problems)
- ជំងឺពីបាក់ចិត្ត (stress)
- ពិសាគ្រឿងស្រវឹង(Alcohol abuse or chronic alcohol use)
- ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន (cocaine និង amphetamines)

គ) កត្តាប្រឈមខ្លះ ដែលជំរុញឱ្យកើតជំងឺលើសឈាម៖

- អាយុច្រើន(បុរសលើសពី៥៥ឆ្នាំ ស្ត្រីលើសពី៦៥ឆ្នាំ)
- មិនសូវ ឬមិនបានហាត់ប្រាណ
- ផក់បារី



- ជំងឺទឹកនោមផ្អែម
- លើសទម្ងន់ ឆាត់
- លើសជាតិខ្លួញ
- មានប្រវត្តិ ឬកំពុងប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលនាំឲ្យលើសឈាម
- ប្រវត្តិក្រុមគ្រួសារមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និង ជំងឺលើសឈាម។

ឃ) ជំងឺលើសឈាមផ្តល់ផលវិបាក ដល់សុខភាព៖

ការកើនឡើងនៃសម្ពាធឈាមលើសពីកម្រិតធម្មតា អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជញ្ជាំងសរសៃឈាម និងសរីរាង្គផ្សេងៗ។ កាលបើសម្ពាធឈាមកាន់តែខ្ពស់ និងមិនបានព្យាបាលត្រឹមត្រូវកាន់តែយូរ ផលវិបាកនិងហានិភ័យដល់សុខភាពកាន់ តែមានច្រើនឡើងៗ។

អ្នកជំងឺលើសឈាមដែលមិនបានទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវ អាចប្រឈមនឹងផលវិបាកដល់សុខភាព ដូចជា៖

- ជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូង ឬជំងឺស្ទះដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល
- ជំងឺគាំងបេះដូង - ជំងឺខ្សោយបេះដូង - ជំងឺខ្សោយតំរងនោម
- ជំងឺងឹតភ្នែក - ជំងឺក្រឡាភ្លើងចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ។

ង) វិបាកការអ្វីខ្លះបើម្យ៉ាងម្តងជំងឺលើសឈាម៖

- បញ្ហាទម្ងន់ និងរក្សាទម្ងន់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ
- ហូបអាហារណាដែលផ្តល់ផលល្អដល់សុខភាពមានដូចជា បន្លែ ផ្លែឈើ បាយ អង្ករសំរោប អាហារដែលសំបូរ ជាតិប៉ូតាស្យូមជាពិសេសផ្លែចេកណាំរ៉ា ផ្លាខាត់ណា ផ្លែប៊ឺរី និងគ្រាប់ផ្កាជាតិជាដើម។
- តមការហូបប្រៃ - បន្ថយការហូបជាតិខ្លួញ និងប្រេង
- ឈប់ពិសាបារី និងគ្រឿងស្រវឹង - បន្ថយបញ្ហាពីបាក់ចិត្ត គិតច្រើន
- ធ្វើលំហាត់ប្រាណយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន៣០នាទីរៀងរាល់ថ្ងៃ។

ច) ការព្យាបាលជំងឺលើសឈាម៖

មកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ជំងឺលើសឈាម មិនទាន់អាចព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយ បាននៅឡើយទេ។ ប៉ុន្តែ ការព្យាបាលដោយថ្នាំ អាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាម ធ្លាក់មកស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតធម្មតាវិញ ជៀសផុតពី ផលវិបាក និងហានិភ័យផ្សេងៗដែលបណ្តាលមកពីជំងឺលើសឈាម។



ស្វែងយល់ពីប្រភេទជំងឺសើស្បែកមួយចំនួន ដែលកើតលើក្មេងតូចៗ!

យើងតែងតែរំពឹងថា ស្បែកកូនក្មេងជាស្បែកផ្លូវផងរលោងហ្មត់ ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់ ក្មេងងាយប្រឈមនឹងបញ្ហាស្បែកដូចមនុស្សធំដែរ ដោយសារស្បែកគឺជាសរីរាង្គ ដែលប្រឈមដោយផ្ទាល់ជាមួយបរិស្ថាន។ ជំងឺស្បែកមួយចំនួនធំដែលកើតលើ ក្មេងតូចតែស្រួចស្រាវ ហើយជារឿយៗ អាចជាដោយខ្លួនឯងដោយមិនបន្សល់ ទុកនូវស្លាកស្នាមអ្វីទាំងអស់។ សូមងាកមកស្វែងយល់ពីជំងឺស្បែកមួយចំនួន ដែលកើតលើក្មេងតូច ដូចខាងក្រោមនេះ៖

- Vernix caseosa : កំអែលខ្លាញ់ស្អិតពណ៌ស ឬ ពណ៌ប្រផេះ អាចមាននៅ លើស្បែកក្មេងដែលទើបកើត ដែលមានតួនាទីចូលរួមការពារទារកប្រឈមនឹង បរិស្ថានជុំវិញ។ ស្ថានភាពស្បែកនេះនឹងវិលមករកភាពធម្មតាដោយខ្លួនឯង។



- Sebaceous hyperplasia: ការរីកត្រដែតនៃក្រពេញខ្លាញ់ នៅលើច្រមុះ ផ្តាស់ ពុកមាត់ និង ថ្ងាស សង្កេតឃើញភាគច្រើននៅលើក្មេងដែលកើតគ្រប់ខែ កើត ឡើងដោយសាររងឥទ្ធិពលអរម៉ូន androgen ពីម្តាយ។ ស្ថានភាពនេះនឹងបាត់ ទៅវិញដោយឯកឯង។



- Milium (plural Milia): កន្ទួលតូចៗពណ៌ស រឹង នៅលើមុខ ខ្លួន ដៃ ជើង ប្រដាប់ភេទ និង ក្នុងមាត់ អាចមាននៅលើស្បែកក្មេងដែលទើបកើត ហើយអាច បាត់ទៅវិញដោយឯកឯង ឬ ករណីខ្លះត្រូវឆ្កិះយកចេញដោយបច្ចេកវិជ្ជាពេទ្យ។



- Miliaria: កន្ទួលពងទឹកតូចៗ ថ្លា ឬ ក្រហមល្អកលាយជាមួយខ្លះ បណ្តាល មកពីសីតុណ្ហភាពក្តៅ នាំឲ្យកកស្ទះរន្ធព្រើស។ ករណីនេះសង្កេតឃើញនៅ ថ្ងាស ក ខ្លួន និង កន្លែងហាប់ៗ ស្ថានភាពនេះអាចបាត់ទៅវិញដោយស្លៀក សំលៀកបំពាក់ត្រជាក់ និង បន្ថយសីតុណ្ហភាពកន្លែងនៅឲ្យត្រជាក់ល្មម។



- Toxic erythema of newborn: ស្ថានភាពនេះកើតឡើងលើក្មេងតូចដែល កើតមិនគ្រប់ខែ ឬ ទម្ងន់តិចជាង ២៥០០ក្រាម។ ស្តែងឡើងជា កន្ទួលស្បែក ក្រហម អាចលាយឡំជាមួយកន្ទួលខ្លះពណ៌លឿងនៅ មុខ ខ្លួន ដៃជើង លើក លែងបាតដៃបាតជើង។ កើតឡើងដោយមូលហេតុមិនច្បាស់លាស់ ហើយកើត នៅថ្ងៃទី២នៃថ្ងៃចាប់កំណើត និងបាត់ទៅវិញបន្ទាប់ពី១ទៅ៤អាទិត្យ។



- Pityriasis alba: ភាគច្រើនកើតលើក្មេងតូចដែលមានជំងឺ atopic dermatitis ស្តែងចេញជាបន្ទះសជាមួយក្រមរស្មឹង ភាគច្រើនសង្កេតឃើញនៅមុខ ជា ពិសេសផ្តាស់។ ជំងឺនេះអាចជាដោយមិនបាច់ព្យាបាល ឬ ជៀសវាងបានដោយ ជៀសកម្តៅថ្ងៃ។ បើករណីធ្ងន់ moisturizing cream និង topical steroid អាចសម្រាលរោគសញ្ញាបាន។

- Molluscum contagiosum: បង្កដោយ poxvirus (molluscum contagiosum virus) សង្កេតឃើញកើតលើក្មេងក្រោមអាយុ១០ឆ្នាំ រស់នៅ តំបន់អាកាសធាតុក្តៅ ឆ្លងដោយការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល តាមរយៈរបស់ប្រើប្រាស់រួម។ ជាកន្ទួលរឹងមានចំណុចផុតកណ្តាល ពណ៌ដូចស្បែក ឬ ក្រហមល្អក។ ព្យាបាលដោយ curettage តាមបច្ចេកទេសពេទ្យបានដោយ មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបន្ថយការចម្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ។



ដូច្នេះ បើលោកអ្នកមានកូនឬក្មួយដែលមានបញ្ហាស្បែក សូមអញ្ជើញមកពិគ្រោះ និងទទួលយកការព្យាបាលជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញសើស្បែកនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ ម៉ែត ដែលនឹងផ្តល់ការព្យាបាលត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកវិជ្ជាពេទ្យ។

បងប្អូនស្រីព្រួយបារម្ភណ៍ ពីគីសដៃស្បូន !



តាមពិតទៅ គុំគីសដៃស្បូន ជាជំងឺទឹកស្រាបដោយស្រោមនៅក្នុង ឬនៅលើផ្ទៃនៃ អូវែរ ដែលនៅសងខាងស្បូនស្រី។

ក) រោគសញ្ញា៖

- ឈឺអាងត្រកាកស្ទុះ និងអាចរាលដាលទៅក្រោយ
- ឈឺអាងត្រកាកមុនចាប់ផ្តើមមករដូវ ឬពេលរួមដំណេក (Dyspareunia)
- ក្អួតចង្កោរ និងមានអារម្មណ៍ចាំពេញណែនច្រង់ក្នុងពោះ
- នោមញឹក ឬក៏ពិបាកនោម
- អាចមានចុកពោះខ្លាំងភ្លាមៗ ព្រមទាំងក្អួត និងក្តៅខ្លួន
- ភាគច្រើនវាវិវត្តន៍ធំជាត់ដោយស្ងៀមស្ងាត់

ខ) មូលហេតុ៖

មូលហេតុនៃជំងឺនេះ កើតឡើងទៅតាមប្រភេទនៃគីសនីមួយៗ៖

១. Follicular cyst: ដោយវាពុំបានបញ្ចេញពងមេជីវិត។
២. Corpus luteum cyst: ពងមេជីវិតត្រូវបានបញ្ចេញ ប៉ុន្តែនូវនោះត្រូវបាន បិទជិតវិញ។ គុំគីសទាំងពីរប្រភេទនេះ (១ និង២)មិនមានបញ្ហាអ្វីទេ វានឹង បាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល ២ ទៅ ៣ខែ បន្ទាប់។
៣. Dermoidcysts: ផ្សំទៅដោយជាលិកាផ្សេងៗដូចជា សក់ ស្បែក ឬក៏ ធ្មេញ...។ ករណីនេះកម្រក្លាយជាមហារីកណាស់។
៤. Cystadenomas: ផ្សំដោយទឹករំអិលខាប់ៗ ដែលកើតចេញពីជាលិកាអូវែរ
៥. Endometriomas: ផ្សំដោយឈាមរដូវខាប់ៗដែលកើតចេញពីកោសិការ អង់ដូម៉ែត និង រីកធំជាត់នៅក្រៅស្បូន។

គ) ផលវិបាក៖

- គុំគីសដែលកើតលើស្រ្តីចំណាស់ក្រោយពេលអស់រដូវអាចក្លាយជាមហារីក។
- Ovarian Torsion គឺជាគុំគីសដែលរមួលបណ្តាលឲ្យចុកពោះខ្លាំង។
- Ovarian Rupture គឺជាគុំគីសដែលបែករំហែកបណ្តាលឲ្យចុកពោះខ្លាំងនិង មាន ឈាមដក់ក្នុងពោះ។

ឃ) ការព្យាបាល៖

ការព្យាបាលគឺអាស្រ័យទៅតាម រោគសញ្ញា អាយុស្រ្តី ប្រភេទ និងទំហំគីស៖

- ករណីធម្មតា (ប្រភេទគុំគីស Follicular cyst និង Corpus luteum cyst): អ្នកជំងឺមិនតម្រូវឲ្យមានការវះកាត់ទេ។
- ករណីធ្ងន់ធ្ងរ គឺតម្រូវឲ្យធ្វើការវះកាត់៖
 - ការវះកាត់ដោយបើកពោះ (Laparotomie)
 - ការវះកាត់ដោយប្រើឧបករណ៍ចោះ (Laparoscopic): ការវះកាត់ដោយ មានស្នាមរបួសតូច មិនសូវមានការឈឺចាប់ និងអាចបានត្រឡប់ទៅជួរឆាប់ រហ័ស។

ការវះកាត់ទាំងពីរនេះមានប្រយោជន៍សំខាន់ដល់ស្រ្តី ដោយរក្សាទុកដៃស្បូន ជាពិសេសស្រ្តីដែលនៅវ័យក្មេង អាចមានបុត្រទៅថ្ងៃក្រោយ។



សញ្ញានិងរោគសញ្ញានៃ គីសដៃស្បូន

ឈឺអាងត្រកាកមុនចាប់ផ្តើម មករដូវ ឬពេលរួមដំណេក

ឈឺអាងត្រកាកស្ទុះ រឹងអាចរាលដាលទៅក្រោយ

នោមញឹក ឬ ពិបាកនោម

អាចមានចុកពោះខ្លាំងភ្លាមៗ ព្រមទាំងក្អួត និងក្តៅខ្លួន



បើសិនជាមានបញ្ហាដូចរៀបរាប់ខាងលើ សូមអញ្ជើញមកមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ដែលមានគ្រូពេទ្យជំនាញឯកទេស និងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ និងកំណត់ប្រភេទគីសឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលសម ស្រប។

សំណួរចម្លើយ Quiz

ទាក់ទងនឹងសុខភាព

Q1. តើជំងឺរបេង មានរោគសញ្ញាដូចម្តេច?

- ១. ហៀរសំបោរ
- ២. ក្អក
- ៣. ឈឺក

Q2. តើទារកគ្រប់ខែ មានទំងន់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ដែលគិតថាត្រឹមត្រូវ សមស្របបណ្ត?



- ១. ចន្លោះពី ១,៥kg ទៅ ២,៥kg
- ២. ចន្លោះពី ២,៥kg ទៅ ៣,៥kg
- ៣. ចន្លោះពី ៣,៥kg ទៅ ៤,៥kg

Q3. ជំងឺរលាកលំពែង បណ្តាលមកពីអ្វី?

- ១. ការពិសារស្រាប័រម្តងតែមានបរិមាណច្រើន
- ២. ការពិសារស្រាបនីមួយៗច្រើនពេលបាយ
- ៣. ការពិសារស្រាប័រជាប្រចាំរយៈពេលយូរ

Q3. ដើម្បីសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ តើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចញ៉ាំកាហ្វេបានប៉ុន្មានពេលក្នុងមួយថ្ងៃ?

- ១. មួយពេល
- ២. ពីរពេល
- ៣. បីពេល
- ៤. លើសពីបីពេល



សូមមេត្តាផ្ញើរឆ្នាំចម្លើយដែលផ្តល់ជូននៅព្រឹត្តិបត្រលេខបន្ទាប់



ទើបតែបាន ៤,៣ គីឡូក្រាម រីកាត់បេះដូងដោយជោគជ័យ!

កុមារ “ម៉ែន ធីម” កើតនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ តាំងពីចាប់កំណើតមក កុមារចំណាយពេលជាច្រើននៅឆ្លិន និងមន្ទីរពេទ្យកុមារ។ កុមារមានប្រហោងថតក្រោម បេះដូងធ្ងន់ធ្ងរ និងត្រូវធ្វើការរីកាត់ជាបន្ទាន់ ពីព្រោះតាមការវិវត្តន៍ពីធម្មជាតិរបស់ជំងឺនេះ អាចឲ្យ ម៉ែន ធីម ប្រឈមមុខនឹងការហួសពេលរីកាត់ក្នុងពេលឆាប់ៗ ខាងមុខ។

ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសបេះដូង មកពីសកលវិទ្យាល័យ MOTOL UNIVERSITY នៃសាធារណរដ្ឋឆែក និងក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេស បេះដូងនៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ម៉ែន ធីម ត្រូវបានធ្វើការរីកាត់សង្គ្រោះជីវិត។

ជាលទ្ធផល ការពិនិត្យនិងអេកូបេះដូងក្រោយការរីកាត់ បានបញ្ជាក់ថាកុមារបានជាសះស្បើយទាំងស្រុង ពោលគឺគ្មានប្រហោងបេះដូងទៀតទេ។ ក្រុមគ្រូសារព្រមទាំងក្រុមការងារនៃផ្នែកបេះដូងមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត មានការត្រេកអរឥតឧបមា។





ឧបត្ថម្ភដោយ



dynamic+



Dexal

Expertise for the Promotion of Health

លេខ ៣ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ: ០១១ ៤១ ៤០ ៦៥, ០៧៧ ៣៦ ១៧ ៥១, ០១៧ ៨៦ ៦៨ ៤៧
អ៊ីម៉ែល: hospital@calmette.gov.kh, វេបសាយ: www.calmette.gov.kh
ហ្វេសប៊ុក: www.facebook.com/calmette.gov.kh